

# BRONQUIOLITIS AGUDA GRAVE

Fallo respiratorio  
(cianosis / palidez, nivel de consciencia alterado)

- A APERTURA VÍA AÉREA**
- Aspiración de secreciones
  - Postura semi-incorporada
  - Preparar material SRI

- B OXÍGENO 100%, MASCARILLA RESERVORIO**
- Si precisa, ventilación con bolsa-mascarilla

- C MONITORIZACIÓN (ECG, TA, EtCO<sub>2</sub>, FR y SatO<sub>2</sub>)**
- Acceso IV, analítica con gasometría venosa

SCORE	0	1	2	3
Sibilancias	NO	inspiratorios	inspiratorios espiratorios	
Tiraje	NO	subcostal intercostal inferior	aleteo y supraclavicular	intercostal superior y supraesternal
Entrada de aire	normal	regular simétrica	asimétrica	muy disminuida
Saturación O <sub>2</sub> Sin O <sub>2</sub>	≥ 95%	91-94%	< 91%	
Con O <sub>2</sub>	sin O <sub>2</sub>	> 94 FiO <sub>2</sub> < 40%	≤ 94 FiO <sub>2</sub> > 40%	
FR < 3 meses	< 40 rpm	40-59 rpm	60-70 rpm	> 70 rpm
3-12 meses	< 30 rpm	30-49 rpm	50-60 rpm	> 60 rpm
12-24 meses	< 30 rpm	30-39 rpm	40-50 rpm	> 50 rpm
FC < 1 año	< 130 lpm	130-149 lpm	150-170 lpm	> 170 lpm
1-2 años	< 110 lpm	110-120 lpm	120-140 lpm	> 140 lpm

Tabla 9. Escala del Hospital Sant Joan de Déu. LEVE <5; MODERADA 6-10; GRAVE 11-16

**SI GRAVE**

• **Ventilación mecánica no invasiva**

**Traslado  
UCIP**